ANEXO

Quadro 1 - Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes

REGIME	FÁRMACOS	FAIXA DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
		20 kg a 35 kg	2 comprimidos	
2RHZE	RHZE (150/75/400/275)	36 kg a 50 kg	3 comprimidos	
Fase Intensiva	Comprimidos em dose	> 50 kg	4 comprimidos	
	fixa combinada 4:1			2 meses
		20 kg a 35 kg	2 comprimidos	
4RH	RH (150/75)	36 kg a 50 kg	3 comprimidos	
Fase de	Comprimido em dose fixa	> 50 kg	4 comprimidos	
Manutenção	combinada 2:1			4 meses

Fonte: Ministério da Saúde, Manual de Recomendações para Controle da Tuberculose no Brasil (adaptado)

Quadro 2 - Esquema para o tratamento da TB Meningoencefálica em adultos e adolescentes

REGIME	FÁRMACOS	FAIXA DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
		20 kg a 35 kg	2 comprimidos	
2RHZE	RHZE (150/75/400/275)	36 kg a 50 kg	3 comprimidos	
Fase Intensiva	Comprimidos em dose	> 50 kg	4 comprimidos	
	fixa combinada 4:1			2 meses
		20 kg a 35 kg	2 comprimidos	
7RH	RH (150/75)	36 kg a 50 kg	3 comprimidos	
Fase de	Comprimido em dose fixa	> 50 kg	4 comprimidos	
Manutenção	combinada 2:1			7 meses

Fonte: Ministério da Saúde, Manual de Recomendações para Controle da Tuberculose no Brasil (adaptado)

Obs.

- 1. Nos casos de concomitância entre tuberculose meningoencefálica e qualquer outra localização, usar o Esquema para a forma meningoencefálica.
- 2. Na meningoencefalite tuberculosa deve ser associado corticosteróide ao esquema antiTB: **Prednisona oral** (1 -2 mg/ kg /dia) por quatro semanas ou **Dexametasona intravenoso** nos casos graves (0.3 a 0.4 mg/kg/dia), por quatro a oito semanas, com redução gradual da dose nas quatro semanas subsequentes.
- 3. A fisioterapia na tuberculose meningoencefálica deverá ser iniciada o mais cedo possível.