



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB

Diretoria de Assistência Farmacêutica - DASF/SAFTEC

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP/SUVISA

NOTA TÉCNICA DASF e DIVEP

Nota técnica sobre Esquema Básico de tratamento da tuberculose e suspensão definitiva da distribuição dos tuberculostáticos nas apresentações em cápsulas de Rifampicina +Isoniazida: dose plena (300mg +200mg) e meia dose (150mg +100mg).

A Diretoria de Assistência Farmacêutica (DASF/SAFTEC/SESAB), através da Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, juntamente com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP/SUVISA/SESAB), através do Programa de Controle da Tuberculose – PCT/BA, dirigem esta nota técnica às Diretorias Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e profissionais de saúde do Estado da Bahia, sobre o fornecimento dos medicamentos contra tuberculose na apresentação de **DFC 4:1** (Dose Fixa Combinada Rifampicina_{150 mg} + Isoniazida_{75 mg} + Pirazinamida_{400 mg} + Etambutol_{275mg}) e **DFC 2:1**(Dose Fixa Combinada Isoniazida_{75mg} + Rifampicina_{150 mg}).

Considerando as orientações técnicas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT/MS (2009), referentes ao Esquema Básico de Tratamento da Tuberculose (2RHZE/4RH)¹ com formulação em Dose Fixa Combinada-DFC, informamos que:

- 1) O novo sistema de tratamento da tuberculose com a **DFC 4:1 (RHZE)** foi implantado na Bahia em 2010, um dos primeiros estados a adotar o Esquema Básico. Esta apresentação deve ser prescrita para início de tratamento de todos os casos de tuberculose (novos e retratamento), durante a fase intensiva (dois meses), observando-se as recomendações do PNCT/MS quanto à dose diária adequada ao peso de cada paciente (Quadros 1 e 2).
- 2) A apresentação **DFC 2:1 (RH)**, disponível desde 2011, deve ser utilizada durante a fase de manutenção do tratamento da tuberculose, por quatro ou sete meses, de acordo com a indicação (Quadros 1 e 2).
- 3) A distribuição dos medicamentos na apresentação anterior (cápsulas R_{300mg} + H_{200mg} e R_{150mg} + H_{100mg}) foi mantida devido a entregas do MS referentes a pedidos antigos, elevando os estoques do estado. A partir deste momento, expirando o prazo da validade dos estoques ainda existentes e não havendo outras entregas pendentes, apenas a **apresentação DFC 4:1 e DFC 2:1** estará disponível para as Unidades Básicas de Saúde.
- 4) Os fármacos em apresentação isolada estarão disponíveis nas Unidades de Referência para o manejo de tratamentos especiais da tuberculose.
- 5) As crianças permanecerão com o esquema RHZ através das apresentações isoladas² de cada fármaco, obedecendo a adequação de doses conforme o peso.

Lindemberg Assunção Costa
Diretor DASF/SAFTEC

Maria Aparecida Araújo Figueiredo
Diretora DIVEP/SUVISA

Salvador-Ba, 16 de maio de 2013

¹ Abreviaturas dos fármacos utilizados no **Esquema Básico** de tratamento da Tuberculose: R= Rifampicina; H= Isoniazida; Z= Pirazinamida; E= Etambutol

² Comprimidos de Isoniazida 100 mg; Rifampicina suspensão oral-20 mg/ml; Pirazinamida solução oral- 30 mg/ml